Vass7R12s511-515

Vass7R12s511-515

Vassal-Montpellier

0Mtp175

Server of the party of the part


Calméria 10 R8+-371-375



alantioi liintaulaataa lantaul

lummhada





lumindanda

ANNEE: 1993

NOM Calméria EMPLACEMENT 10R8 s-371.375
Bulg. 57.76

Juntumbunh

dantiidiitiiidaandantad

uche Nbre	A CONTRACTOR OF THE PERSON	rrement mi/déb		Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité
1 8 4	16,3	18.3,	0								
4) K	18.3	3 3		Couleur Saveur Pépins Port:	TG - 0 disc-s r : B-0 : s -	Mil. S - M - Sph-el. Gr-Rs-l m - a	l: - P D: l-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	rl-fus : inc		L - M -C

EV.	NOM Calmeria EMPLACEMENT NO RP 1371.375 Bulg 57.76													
Souche	Whre Débourrement Mbro yeux début mi/déb gra					rti- Floraison Véraison té début mi/f fin début mi/v fin				Maturit é				
× 2× × 4	34 3	21.2	28 21	0						Compac	cité	: L - %- C		
×	3				Pour: Baie: TC - G - 'I - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb									
	De	28.2.	4 (-7)		<u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :									

ANNEE: 1995
NOM Calmeria (mi)

luminilama

EMPLACEMENT NO R8 & 371.375

dinambininghatadaatad

ouche	Mbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité	Flo:	raison mi/f		Vé: début	raison mi/v	Maturit é
1 7	4	6.3	13.3	0							
5 8	24	13.3	25(-4)		Crappe Pour: Baie: Couleur Saveur Pépins Port:	TG - disc-s r : B-G : s -	Milli - M - ph-ell r-Rs-I m - ar	L: - P Di l-ov-c Rg-N - fo	im : bbov-cy Jus	l-fus : inc	L - M -C

	1												
ANG	ANHEE: 1996 MOM Calmeria MD RR & 371.375												
	g · 57.												
uche	Nbre yeux	Débout début	rement mi/déb	ubre grap	Ferti- lité		mi/E	fin		mi/v	fin	Maturité	
1	f												
2	3	11.3	183.	0									
3	8								:	Compac	itó	: L - 11 -C.	
d 5	1	Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim:											
ľ	A De	18.3.	R6 (+9)		Couleu				obov-c Jus	yl-fus : inc	- C	oloré	
	نه رام	70.3.	(2)		Saveur	: 5 -	m - a	ar - f	ox - h	erb			
					Popins Fort:	: ave	c - ap		igueur	: .,			

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Calméria 10 R8 s - 371-375 + 2

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198 Jame

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 /- séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233./

A pétiole glabre 234) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calve 92

Nº d'ordre :

Désignation :

Calméria 10 R8 s - 371-375 s.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 92

N° d'ordre :

Désignation :

Calméria 10 R8 s. 371-375 s.2

duntarilantarilarieriantaril

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1/42/- grande 1/43.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre (44) - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité

laineuse 273. limbe : glabre 150/- séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 1(71) - court 172. Glabre 1/73 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Ludnolodo

1999 Observateur Innée Code clone: c'ode cepage Emplacement 10 R 8 & 3 7/ 375 Nom cépage: Calmeria Grappe Oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) (5)- longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm)(5) large (15-20cm)(7) très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 2 très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)(3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.) oiv 208* forme: cylindrique 1 - conique ou pyramidale(2) oiv 209* présence d'un aileron : absent/\(\gamma\) - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4 Baie ony 220 longueur: tres courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (~26mm)(9) oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20comm) 7) très large (>26mm) 9. Div 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3 oiv 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 ylindrique 7 - arquée 8. biy <u>225 couleur épiderme</u> : vert jaune D-rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. ory 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme 2.) oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. nv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 tres épaisse 9. ouv 229 ombilie peu apparent Dapparent 2. région ombilicale deprimée oiv 230* coloration de la pulpe : non colore D coloree 2. oiv 231 intensité coloration pulpe non colorée D- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1) juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (65-75) 5 élevé (<75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevee (9.) ory 236 saveur : aucune D- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5 ory 236* saveur : aucune 1) goût muscat 2 - goût foxe 3 - autre 4 on 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5-long (12-16mm) 7 - très long (~16mm) 9 oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5)- difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3. oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. orv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) très faible (> 10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes(1) presentes

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9.

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année :

2000

dentrologi

Observateur: TD

Code cépage : Calmeria

Code clone

Emplacement: 10 R81371-375

dantan hartinda ataa lantaul

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique & - aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée &

oiv 103 couleur générale : jaune f)- brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence Ø- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 7 - présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 32 moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) Ø - moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens \(\extstyle \text{- saillants 3} \).